

MAP 1. Southern representatives of order Cidaroida, subfamily Ctenocidarinae

- ▲ *Ctenocidaris*
  - 1 *geliberti*
  - 2 *nutrix*
  - 3 *perrieri*
  - 4 *polyplax**
  - 5 *speciosa*
  - 6 *rugosa*
- ⊕ *Ogmocidaris benhami*
- ★ *Rhynchocidaris triplopora*
- ⊛ *Homalocidaris gigantea*
- ● *Aporocidaris*
  - 7 *antarctica*
  - 8 *incerta*
- ○ *Notocidaris*
  - 9 *gaussensis*
  - 10 *hastata*
  - 11 *mortenseni*
  - 12 *platyacantha*
  - 13 *remigera*
  - 14 *spinosa*
- *Austrocidaris*
  - ■ *canaliculata*
  - ✦ *spinulosa*

*Only one record



MAP 2. Genus *Sterechinus*
(Bathymetric range of genus: 0 to 1566 m)

- ● *agassizi*
- ■ *antarcticus*
- ▲ *dentifer*
- ✦ *diadema*
- ⊕ *neumayeri*



MAP 3. Species of the genus *Pseudechinus* which occur in latitudes higher than 35°S

- ■ *albocinctus*
- ● *flemingi*
- ⊕ *huttoni*
- ▲ *magellanicus*
- ◩ *marionis*
- ⊛ *notius**
- ★ *novaeamsterdamiae*
- ♦ *novaezealandiae*
- ✦ *sanctipauli*



MAP 4. Genus *Abatus*

- ■ *agassizi*
- ▲ *bidens*
- ● *cavernosus*
- ✦ *cordatus*
- ♦ *curvidens*
- ♦ *elongatus*
- ■ *ingens**
- ▲ *nimrodi*
- ⊕ *philippi*
- ● *shackeltoni*

*Only one record



MAP 5. Genus *Amphipneustes*

- ● *bifidus*
- ⊕ *brevisternalis*
- ✦ *koehleri*
- ■ *lorioli*
- ◩ *marsupialis*
- ⊛ *rostratus*
- ♦ *similis*
- ▲ *tumescens*



MAP 6. Spatangid genera *Paramaretia* and *Spatangus* and southern representatives of the Family Schizasteridae excluding *Abatus* and *Amphipneustes*

- △ *Brisaster*
  - 1 *kerguelensis*
  - 2 *moseleyi*
  - 3 sp.
- ✦ *Tripylus*
  - 4 *cordatus*
  - 5 *excavatus*
  - 6 *reductus*
- ● *Tripylaster philippi*
- ■ *Paramaretia*
  - 7 *peloria*
  - 8 *multituberculata*
- ○ *Spatangus*
  - 9 *multispinus*
  - 10 *thor*
  - 11 *beryl*

COMPILED BY D. L. PAWSON